Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Fekete Tamás Ferenc főorvos
Tel: 28-5o7-711, e-mail: szuleszet-nogyogyaszat@florhosp.hu

12. BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Diagnosztikus méhtükrözés

Tájékoztatjuk Önt, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhessük írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a műtétnek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

A műtét lényege
Endoszkópos műtéti eljárás, amellyel megvizsgáljuk a méh üregét, az azt bélelő nyálkahártyát, valamint a petevezetők beszájadzását. A műtét helyi érzéstelenítésben vagy altatásban történik. A műtét az egynapos sebészeti beavatkozások közé tartozik.

Hogyan történik a műtét?
Hüvelyi fertőtlenítés után a feltágított méhszájon keresztül a méh üregébe vezetjük az optikai eszközt, és tágító anyaggal (folyadék vagy gáz) töltjük fel. Ezután megvizsgáljuk a méh üregi felszínét és a petevezetők szájadékát, végül eltávolítjuk az eszközt. A beavatkozás gyors, a beteg megterhelése kicsiny. Távozás általában még aznap lehetséges. Diagnosztizálni lehet kóros vérzés hátterében álló méhüregi miomák, polypok, megvastagodott nyálkahártya jelenlétét, meddőséget okozó összenövéseket, előzetes császármetszés fonalát, nehezen eltávolítható méhen belüli fogamzásgátló eszköz elhelyezkedését, továbbá fejlődési rendellenességeket és igen ritkán kezdődő rosszindulatú daganatokat is.

A műtét kockázatai és szövődményei:
Előfordulhat a méh sérülése, amely vérzéssel is járhat, vagy felléphet vérzés önmagában. A sérülés ritkán a méhfal átfúródásával is járhat. Ilyenkor hastükrözéssel lehet ellenőrizni és ellátni a sebet.
Ritkán bél, illetve hólyagsérülés is előfordulhat, melyek ellátására szintén hastükrözést alkalmazunk.
Műtét után előfordulhat görcs, illetve hüvelyi folyás.

Alternatív kezelési módok
A vérzési rendellenességeket okozó szövettani eltérések, polypok méhkaparással vett mintából diagnosztizálhatók. A méh fejlődési rendellenességei alaki eltérései más képalkotó eljárásokkal (ultrahang, HSG) tisztázhatók.

A műtét elmaradásából adódó hátrányok
A fent leírt elváltozások nem kerülnek elég korán felismerésre.