Kistarcsai
Flór Ferenc Kórház

Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Fekete Tamás Ferenc főorvos
Tel: 28-5o7-711, e-mail: szuleszet-nogyogyaszat@florhosp.hu

29. BETEGTÁJÉKOZTATÓ
HASÜREGI FOLYADÉKBÓL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL (DOUGLAS PUNCTIO)

Tájékoztatjuk Önt, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhessük írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a műtétnek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

A beavatkozás célja, előnyei:
Bizonyos esetekben (méhen kívüli terhesség, kiterjedt kismedencei gyulladás, endometriózis, rosszindulatú nőgyógyászati folyamatok) szükség lehet, az ultrahangvizsgálattal igazolt, kismedencei folyadékgyülemből történő, mintavételre, melynek cytológiai vizsgálata pontosabb diagnózist ad a szóban forgó folyamatról. Amennyiben a folyamat előrehaladott, további beavatkozásra és műtétre van szükség.

Hogyan történik a műtét?
A beavatkozás hüvelyi úton történik. A hátsó hüvelyboltozaton keresztül egy vékony tűt használva, viszonylag minimális szöveti károsodás útján, a hasüreg legmélyebb pontjába, az úgynevezett "Douglas üregbe" jutunk, ahonnét bizonyos mennyiségű folyadékot szívunk le, amelyből cytológiai vagy laborvizsgálatokat végezhetünk.

A műtét lehetséges szövődményei:
Vérzés, fertőzés, a méh, a belek sérülése, átfúródása, a sebgyógyulás zavara fordulhat elő. A szövődmények előfordulása ritka. A műtét után 1-2 hétig bővebb hüvelyi folyás állhat fenn. Utóvérzés ezen műtéti típus után ritkán fordul elő, mint más műtétek után.

Alternatív kezelési módok
A műtétes beavatkozásnak nincs alternatívája, mert a cytológiai vizsgálatot - amennyiben szükség van rá - nem helyettesíti más eljárás.

A műtét elmaradásából adódó hátrányok:
Nem tisztázódik a folyamat, és ha daganatos elváltozás vagy akut, életveszélyt is jelenthető folyamat fennáll, akkor súlyosbodó vagy gyógyíthatatlan állapot alakulhat ki.

Kistarcsa, 2022. február 1./4 verzió Összeállította: Dr. Fekete Tamás Ferenc osztályvezető főorvos