Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Fekete Tamás Ferenc főorvos
Tel: 28-507-71 1, e-mail: szuleszet-nogyogyaszat@florhosp.hu

35. BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Pipelle-lel mintavétel

A pipelle mintavétel egy minimális invazív beavatkozás, a méh altatásban történő szövettani vizsgálatnak lehetséges alternatívája a kivitelezhető esetekben.

A szövettani vizsgálata méh üregéből történik. Alkalmas a méh rák-rnegelőző állapotainak és még rosszindulatú betegségeinek kiszűrésére.

Beavatkozás menet: előkészületek nem szükségesek, ambulánsan elvégezhető. A beavatkozás során minimális fájdalom előfordulhat. A hüvelyi feltárás után a méhnyak fertőtlenítését követően a mintavevő egységet méhüregbe vezetjük, majd mintát veszünk, a kapott anyagot szövettani vizsgálatra küldjük.

Szövődmények: a leggyakoribb szövődmény a beavatkozás alatti fájdalom. Minimális vérzés is előfordulhat pár napig a beavatkozás Után. A méh áthatoló sérülések a veszélye I -2/1000. Ritka szövődménye az erőteljes vérzés, a kismedencei fertőzés.
A beavatkozás után pár perces nyugalom szükséges.

Láz és egyéb panaszok vagy hasi fájdalom a beavatkozást követő 48 órában, vagy a vérzés erősödése esetén azonnal kontroll javasolt.

Kistarcsa, 2022. február 1. /4 Összeállította: Dr. Fekete Tamás Ferenc osztályvezető főorvos