Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Fekete Tamás Ferenc főorvos
Tel: 28-5o7-711, e-mail: szuleszet-nogyogyaszat@florhosp.hu

5. BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Hüvelyfali plasztika

Tájékoztatjuk Önt, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhessük írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a műtétnek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

A műtét lényege
A hüvelyfali sérv műtéti feltárása, elbuktatása, a sebszélek zárása (a sérv nagyságától, súlyosságától függően a megfelelő műtéttechnikai eljárás alkalmazása).

A beavatkozás célja
A megsüllyedt hüvelyfal, a hólyagalap és/vagy hólyagnyak, húgycső eredeti anatómiai helyzetének helyreállítása, az esetleg együttesen meglévő vizelettartási panaszok megszüntetése, a húgycső zárófunkciójának helyreállítása. A végbélsérv buktatásával annak megszüntetése, az eredeti anatómiai helyzet helyreállítása.

Az ellátás folyamata és várható kimenetele:
Megfelelő érzéstelenítésben a megnyúlt hüvelyfalon metszést ejtünk a hüvelyfali sérvet kipreparáljuk, elbuktatjuk. A felesleges hüvelyfali részek eltávolítása után a sebszéleket öltésekkel zárjuk.
A hólyagba állandó katétert helyezünk, melyet a műtétet követő napon távolítunk el. Spontán vizelet ürítést (melyet ultrahang vizsgálattal ellenőrzünk) követően távozhat kórházunkból.

Kockázatai, illetve lehetséges szövődményei:
- Műtét sikertelensége esetén a süllyedések és a panaszok kiújulása.
- Hólyag-, húgycső-sérülés, ezek esetén 2 hétig állandó katéter viselés, antibiotikum kezelés, végbélsérülés esetén ideiglenes sztóma készítése. Ezen esetekben a szövődmények társszakmák (sebész, urológus) bevonásával történik. Környező lágyrészek sérülései, tartós katéter viselés; Vérzés, gyulladás, trombózis, embólia. A behelyezett varratok elégtelensége.

Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:
- Beavatkozás elhagyása
- Gyógyszeres kezelés
- Speciális torna, inkontinencia betét viselése
- Egyéb inkontinencia javító műtéti eljárások (szalag, vagy háló beültetés)

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázatai:
A panaszok fokozódása, tartós vizelettartási képtelenség kialakulása, húgyúti fertőzések gyakoribbá válása a hólyag-, végbélsérv kifejezettebbé válása, végbél kiürítésének zavara, házaséleti nehezítettség, hüvelyfal kisebesedése.

Kistarcsa, 2022. február 1./4 verzió

Összeállította: Dr. Fekete Tamás Ferenc osztályvezető főorvos