Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Fekete Tamás Ferenc főorvos
Tel: 28-5o7-711, e-mail: szuleszet-nogyogyaszat@florhosp.hu

7. BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Prolapsus hálók beültetése

A műtét lényege:
Az elgyengült hüvelyfal, a kismedencei kötőszövetek, szerveket tartó szalagok szövetbarát anyagokkal történő megerősítése.

A beavatkozás célja:
A süllyedéses kórképek hálókkal történő korrigálásával a kismedencei szervek eredeti anatómiai helyzetének és az élettani működésnek a lehető legjobb helyreállítása. A megsüllyedt hüvelyfalak, hüvelyboltozat, a hólyagalap és/vagy hólyagnyak, húgycső eredeti anatómiai helyzetének helyreállításával a húzó kismedencei fájdalom, a hüvelyi kiboltosulás, a vizelettartási panaszok megszüntetése, a húgycső zárófunkciójának helyreállítása, vagy a megsüllyedt méh kismedencébe történő visszaemelése, rögzítése mellső és/vagy hátsó hüvelyfali hálóval történhet.

Az ellátás folyamata:
A kívánt korrekciónak megfelelő terület műtéti feltárása, szövetek közti preparálás után szövetbarát műanyag háló, és/vagy szalag beültetése, azoknak a kismedence meghatározott anatómiai pontjaihoz rögzítése során. A sebszélek zárása. A hólyagba állandó katétert helyezünk, a hüvelyt általában tamponnal tömjük ki. A tampont másnap, az állandó katétert három nap után távolítjuk el.

A beavatkozás előnye:
A szövetbarát anyag beépülése után alig fordul elő ismételt kiújulás, a tartós gyógyulás esélye 8090%.

A beavatkozás kockázatai, lehetséges szövődményei:
- Műtét sikertelensége esetén a panaszok, megmaradása, esetleg kiújulása. A háló vagy szalag fölött a seb gyógyulási zavara, a szalagok, hálók kilökődése.
- Végbél sérülése esetén ideiglenes sztóma kialakítása, környező lágyrészek, a hólyag, a húgycső sérülése, ez esetben két hétig állandó katéter felhelyezés, antibiotikumos kezelés. A kezelés során szükséges lehet társszakmák (sebészet, urológia) bevonására is. Házaséleti nehezítettség. Vérzés, gyulladás, láz, trombózis, embólia.

Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:
- Beavatkozás elhagyása.
- Gyógyszeres kezelés.
- Speciális torna, inkontinencia betét viselése.
- Más műtét végzése.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázatai:
A meglévő panaszok fokozódása, tartós vizelettartási képtelenség kialakulása, húgyúti fertőzések gyakoribbá válása. Hólyagsérv és a hüvelyfali süllyedés, méhsüllyedés kifejezettebbé válása, hüvelyfalak kisebesedése, vizeletelakadása.

Kistarcsa, 2022. február 1./4 verzió

Összeállította: Dr. Fekete Tamás Ferenc osztályvezető főorvos